PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: Fungicida biológico en base a esporas de la Cepa IAB/BS/03 de la bacteria *Bacillus subtilis*.

Precauciones durante la manipulación:

Se recomiendan las siguientes medidas:

Se debe utilizar ropa y elementos de protección personal durante el manejo del producto.

Durante la preparacion de la mezcla usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y máscara con filtro y antiparras. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable y máscara con filtro y antiparras. No fume, coma o beba durante la manipulación y el uso de este producto. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica. Lavarse prolijamente con agua limpia antes de comer, beber, fumar o ir al baño, después del trabajo. Evitar contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el producto ni la neblina de pulverización.

Recomendaciones en caso de intoxicación o accidente:

Primeros auxilios: Contacto con los ojos: Lavar immediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continuar con el enjuague. Además, las lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico si es necesario. **Contacto con la piel**: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación consultar al médico. **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica. **Ingestión: NO INDUCIR EL VÖMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Síntomas:** Pueden presentarse síntomas de intoxicación no específicos como fatiga, malestar general, mareos, náuseas, entre otros

.

Teléfono de urgencias toxicológicas (RITA):+56 2 2777 1994

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA."

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO HUMANO O ANIMAL. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO".

Riesgos medioambientales: No es tóxico para organismos acuáticos, aves ni animales. Virtualmente no tóxico para abejas.

Almacenaje: OSPO-Vi55 debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 10–25ºC.

OSPO-Vi55

FUNGICIDA BIOLÓGICO
POLVO MOJABLE (WP)

Ospo-Vi55 es un fungicida biológico con acción preventiva para el control de oídio en frutilla y uva.

Composición (p/p):

Bacillus subtilis cepa IAB/BS/03*.....0,01% m/m (0,1 g/kg)

Coformulantes, c.s.p. 100% m/m (1 Kg)

*Continen mínimo 2,42x10^{6}UFC/g

Autorización del servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.989-O

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTENIDO NETO: **1 kg**

MASA NETA: **XXX**

FECHA DE FABRICACIÓN: **XX/XX/20XX**

FECHA DE CADUCIDAD **XX/20XX**

LOTE: **XXXXXXX**

Fabricado por:

Grupo Agrotecnología, S.L. (IBERFOL).
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57
03300, Orihuela (España)

ORO AGRI EUROPE S.A.
Rua de Biscaia N°2, Palmela 2950-034 PALMELA, Portugal.

Distribuido por:
MipAgro Ltda.
Tel. (72) 255-3696
www.mipagro.cl
REQUINOA

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

"AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL"

El modo de acción del ingrediente activo OSPO-Vi55 corresponde a fungistático y fungitóxico, la competencia natural por el espacio vital y los nutrientes.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/hl)	OBSERVACIONES
Frutilla invernadero	Oídio (*Sphaerotheca macularis*)	500	Se recomienda un mínimo de seis aplicaciones, entre floración y cosecha, con un mojamiento de 600 L/h. Cuando las condiciones ambientales sean favorables al Desarrollo de la enfermedad se recomiendan hasta doce aplicaciones.
Uva	Oídio (*Erysiphe necator*)	500	Aplicar de forma preventiva. Se recomiendan hasta cinco aplicaciones, desde inicio de racimo a cosecha, con un mojamiento de 1500 L/ha, para disminuir la incidencia y severidad de Oídio en vides.
Nectarines, duraznero, cerezo, ciruelo, damasco, almendro	Oídio *(Sphaerotheca pannosa)*	400 a 500	Se recomienda realizar hasta 8 aplicaciones por temporada, desde cuaja a precosecha.Mojamiento de 1000 - 1500 L/ha. Aplicar dosis mayor si existe mayor presencia de patógeno.
	Pudrición morena *(Monilinia fructicola)*	400	Se recomienda realizar hasta 8 aplicaciones por temporada, desde cuaja a precosecha.Mojamiento de 1000 - 1500 L/ha.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque hasta 1/3 de su capacidad con agua. Agregar la cantidad de Ospo-Vi55 recomendada y completer con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

Incompatibilidad: No mezclar OSPO-Vi55 con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Fitotoxicidad: No se ha observado fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda.

Tiempo de Reingreso para personas y animales: 4 horas después de la aplicación.

Periodo de carencia: 0 días.

Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz: No aplicar con viento superior a 10 km/hora. No aplicar con temperaturas superior a 30°C. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.



CUIDADO

