OSPO Vi55®

Biofungicida biólogico con acción preventivo y curativo para el control de oídio en frutilla y uva.

Rovensa Next

Biofungicida

Autorización SAG N° 2989

Descripción

OSPO-Vi55® es un biofungicida altamente eficaz para el control del oídio en cultivos frutales, desarrollado exclusivamente por Rovensa Next, en base a *Bacillus subtillis*. Tanto la cepa, como el proceso de formulación del producto final, son fruto del desarrollo biotecnológico propio de Rovensa Next.

OSPO-Vi55® actúa directamente sobre el patógeno, vía enzimas hidrolíticas y metabolitos antimicrobianos; por otro lado, estimula el sistema inmunológico de la planta y aporta sustancias antioxidantes que fortifican los tejidos y minimizan el daño del estrés biótico.

OSPO-Vi55® no genera resistencia y es indicado para complementar programas de manejo integrado. **OSPO-Vi55®** es un producto con tecnología CERO RESIDUO y puede ser usado desde brotación a cosecha y cuenta con registro SAG como fungicida biológico para vides, frutilla y frutales.

Principales beneficios

- Elevada eficacia preventiva y erradicante frente a oídio.
- Rápido efecto (24 - 48 h).
- Fortalece los tejidos de los frutos y la planta.
- Sin residuos pesticidas, ni plazos de seguridad.
- No produce resistencias.
- Excelente perfil de compatibilidad.

Especificaciones técnicas

0,01 % m/m (0,1 g/kg)	*Bacillus subtilis* Cepa IAB/BS/03*
100 m/m (1 Kg)	Coformulantes, c.s.p.
	**Contienen mínimo 2,42 x 10^6 UFC/g*

info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile

OSPO Vi55®

Rovensa Next

Recomendaciones de uso

Aplicación foliar			
Cultivo	Plaga	DOSIS g/hL	Observaciones
Frutilla invernadero	Oídio *(Sphaerotheca macularis)*	500	Se recomienda un mínimo de seis aplicaciones, entre floración y cosecha, con un mojamiento de 600 L/h. Cuando las condiciones ambientales sean favorables al Desarrollo de la enfermedad se recomiendan hasta doce aplicaciones.
Uva	Oídio *(Erysiphe necator)*	500	Aplicar de forma preventiva. Se recomiendan hasta cinco aplicaciones, desde inicio de racimo a cosecha, con un mojamiento de 1500 L/ha, para dismunuir la incidencia y severidad de Oídio en vides.
Nectarines, Duraznero, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Almendro	Oídio *(Sphaerotheca pannosa)*	400 a 500	Se recomienda realizar hasta 8 aplicaciones por temporada, desde cuaja a precosecha. Mojamiento de 1000 - 1500 L/ha. Aplicar dosis mayor si existe mayor presencia de patógeno.
	Pudrición Morena *(Monilinia fructicola)*	400	Se recomienda realizar hasta 8 aplicaciones por temporada, desde cuaja a precosecha. Mojamiento de 1000 - 1500 L/ha.

Compatibilidad

No mezclar **OSPO-Vi55®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Versión: 16/10/2026

Presentación: **1 Kg.**