

CARACTERÍSTICAS

Phylgreen es un potente bioestimulante en base a Ascophyllum nodosum fresco procedente del exclusivo proceso de extracción suave (gentle extraction), cosechadas a mano y a baja temperatura conservando las propiedades bioactivas del extracto.

Cuando se aplica antes de situaciones de estrés abiótico, el efecto primactive aprovecha las propiedades bioestimulantes de Phylgreen® rico en manitol, alginato, polifenoles y antioxidantes para reducir la gravedad del estrés, ayudando a maximizar el rendimiento y la rentabilidad.

Phylgreen está especialmente recomendado para estimular la brotación, floración, cuaje, maduración y mejorar la adaptación de las plantas después del trasplante, superando cualquier condición de estrés ambiental.

DOSIFICACION			
Aplicaciones Foliares			
Cultivo	Concentración (cc/100L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Almendro	50 – 150	1,0 - 1,5	Durante brotación, floración, desarrollo de fruto y post cosecha. Previo y durante estrés abiótico. Cada 7 a 14 días.
Cerezo			
Ciruelo			
Kiwi			
Manzano, Peral			
Nectarino, Duraznero			
Nogal			
Vid de Mesa			
Vid vinífera			
Avellano Europeo			
Cítricos y Paltos	50 - 125	1,0 – 2,0	Durante brotación, floración, desarrollo de fruto y post cosecha. Previo y durante estrés abiótico. Cada 14 a 30 días
Durante brotación, floración y desarrollo de fruto. Previo y durante estrés abiótico. Cada 14 a 30 días			
Durante brotación, floración, desarrollo de fruto y post cosecha. Previo y durante estrés abiótico. Cada 7 a 14 días.			
Berries (Arándano, Frambueso, Frutilla, Moras)			
Hortalizas de hoja			
Desde una a dos semanas post trasplante y durante todo el ciclo del cultivo. Previo y durante estrés abiótico. Cada 7 a 14 días. Inmersión de plantines previo a trasplante			
Tomate, Pimentón, Aji			
Melón, Sandía			
Cereales			
Desde fase vegetativa y desarrollo de macolla, en fase reproductiva – hoja bandera. Previo y durante estrés abiótico. 1 a 6 aplicaciones.			
Raps	125 - 250	0,5 – 1,0	Desde inicio de floración hasta finales de esta. 1 a 2 aplicaciones. Previo y durante estrés abiótico Cada 7 a 14 días.
Papa			
Desde plantas de 10 a 15 cm. Previo y durante estrés abiótico. Cada 10 a 14 días			
Pasturas: Alfalfa y otros			
En cada corte.			
Rosas (otros ornamentales)			
2 a 8 aplicaciones cada 14 a 28 días.			
100 - 200			
125 - 250			
125 - 250			

Aplicaciones por Fertilirrigio		
Especies	Dosis (L/ha)	Observaciones
Frutales	1,0 - 3,0	Cada 10 a 30 días.
Hortalizas	0,5 - 1,5	Cada 7 a 21 días.

OBSERVACIONES

Se garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta etiqueta.



Phylgreen®

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Ácido alginico	1.82 % p/p	1.94 % p/v
Manitol:	1.28 % p/p	1.36 %p/v
Materia Orgánica total:	12.51 % p/p	13.31% p/v
(100% Extracto Ascophyllum nodosum)		

TIPO DE PRODUCTO: Bioestimulantes en estado líquido

Densidad(g/L) a 20°C	1065
pH (10%)	3,64

Metales Pesados

Arsénico (As):	8.8 mg/kg
Cadmio (Cd):	< 0.50 mg/kg
Mercurio (Hg):	< 0.200 mg/kg
Plomo (Pb):	< 2.00 mg/kg
Níquel (Ni):	< 0.50 mg/kg
Cromo Hexavalente (Cr):	< 0.5 mg/kg

FABRICANTE: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
ORIGEN: España
LOTE: 25D4045
FECHA DE FABRICACION: 16/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/2027
REF.ENVASADO:

CONTENIDO NETO
20 L (4X5 L)

Importado y distribuido por:
Mip-Agro SPA
Teléfono: (72) 2 585 210
www.mipagro.cl
REQUINO A



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =