

Energía inmediata para floración, cuaja y desarrollo.

Bioestimulante

Descripción

Fertigro + es un potenciador del desarrollo vegetal en momentos de alta demanda energética. Acelera ciclos de floración, aumenta cuaja y retención de frutos, manteniendo plantas de elevada vitalidad y metabolismo de carbohidratos. Es una fuente directa de energía ultra eficiente de directa disponibilidad para la planta.

Principales beneficios

- ▶ Reacción entre ortofosfatos y humus para formar un complejo orgánico de fácil asimilación para la planta.
- ▶ Alto contenido de ortofosfatos (75-80%) que permiten que la planta tome el fósforo directamente del producto.
- ▶ El fósforo aportando no queda retenido en el suelo, ya que no representa carga porque viene adherido a una molécula orgánica.
- ▶ Mayor movilidad del fósforo en el perfil del suelo.
- ▶ Una mejor asimilación de fósforo y humus determinan un mejor sistema radicular, lo cual aumenta la capacidad de la planta para explorar el suelo.
- ▶ Su aporte de fracción orgánico, permite acondicionar el suelo y potenciar su vida microbiana.

Composición

10.57 % (p/v)

Nitrógeno Total (N)

30.91 % (p/v)

Fósforo (P)

2.30 % (p/v)

Ácidos Orgánicos (derivados de leonardita)



Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego

Cultivos	Dosis	Número y Etapa de Aplicación
Cerezo, Almendro, Damasco, Nectarino, Durazno, Ciruelo	5,0 - 10 L/ha	Desde inicio de flor. 1 a 2 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Manzana, Membrillo, Pera		Durante floración. 1 a 2 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Palto		Desde prefloración hasta caída de pétalos. 1 a 2 aplicaciones. Cada 10 a 14 días.
Mandarino, Naranja, Limonero, Clementino, Pomelo, Tangelo		Desde inicio de brotación hasta frutos de 10 mm. 1 a 2 aplicaciones. Cada 14 a 21 días.
Avellano		Desde inicio de flor pistilada hasta frutos recién cuajados. 1 a 2 aplicaciones cada 10 a 14 días.
Nogal		Desde inicio flor. 1 a 2 aplicaciones cada 10 a 14 días.
Olivos		Desde inicio de flor. 1 a 2 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Kiwi		Desde inicio de flor de bayas. 2 a 3 aplicaciones. Cada 7 días.
Uva de Mesa, Pisquera, Vinífera		Durante floración hasta cuaja. 1 a 2 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Pistacho		Durante floración hasta cuaja. 2 a 4 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Arándano, Mora, Frambuesa, Cramberries, Zarzaparrilla	2,5 - 5,0 L/ha	Durante floración hasta cuaja. 2 a 4 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Frutilla		Desde 2da y 5ta hoja. 1 a 2 aplicaciones.
Avena, Trigo, Arroz, Cebada, Canola, Triticale		1 a 2 aplicaciones desde espigamiento hasta floración.
Maíz, Maíz Dulce, Maíz Silo		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Remolacha, Nabo forrajero		Desde 15 días post trasplante, floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Tomate industrial		Desde siembra y/o post siembra, 6ta y 8va hoja y 30 días después.
Papa, Zanahoria		Realizar las aplicaciones después de cada corte cuando la planta tenga entre 10 y 15 cm de altura.
Alfalfa, Ballica, Trébol, Césped		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Arvejas, Habas, Porotos, Garbanzo, Lenteja, Lupino, Soya		Desde 15 días post trasplante, floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Ajo, Cebolla, Puerro		Desde 15 días post trasplante, 1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Tomate, Berenjena, Ají, Pimiento		Desde 15 días post trasplante, floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Repollo, Brócoli, Coliflor		Desde 15 días post trasplante, floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Melón, Sandía, Zapallo		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Espárrago, Apio, Alcachofa		
Lechuga, Rúcula, Espinaca, Acelga		
Albahaca, Cilantro, Perejil, Orégano, Salvia		

Compatibilidad

Fertigro + es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales presentes en el mercado, ante cualquier duda realizar una prueba de compatibilidad. No mezclar con productos en base a Calcio y Magnesio en el estanque de fertirrigación, tales como: Nitrato de Calcio, Sulfato de Calcio, Carbonato de Calcio, Sulfato de Magnesio, Nitrato de Magnesio. No aplicar con pH inferiores a 4,0.