

Optimiza el rendimiento, floración y formación de frutos.

Bioestimulante

Descripción

Maxigrow Excel es un producto enfocado en aumentar división celular, calibre y productividad de frutales y cultivos. Obtenido de bioprocesos rigurosamente controlados a partir de algas marinas, para concentrar metabolitos altamente bioactivos con el propósito de mejorar el equilibrio entre actividad fotosintética y respiración de la planta.

Principales beneficios

- ▶ Potencia floración y disminuye el aborto floral.
- ▶ Previene la entrada en estado de estrés.
- ▶ Aumenta cuaja y rendimiento del cultivo.
- ▶ Mejora y concentra calibre.
- ▶ Cero residuo.

Composición

23.61 % (p/v)	Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>
46.35 % (p/v)	Materia seca
1.10 % (p/v)	Nitrógeno total
1.32 % (p/v)	Fósforo (P ₂ O ₅)
0.31 % (p/v)	Calcio (CaO)
1.21 % (p/v)	Potasio (K ₂ O)
1.68 % (p/v)	Hierro (Fe)
4.11 % (p/v)	Zinc (Zn)
1.33 % (p/v)	Manganeso (Mn)
1.48 % (p/v)	Cobre (Cu)



Recomendaciones de uso

Aplicación foliar		
Cultivos	Dosis	Número y Etapa de Aplicación
Cerezo, Almendro, Damasco, Nectarino, Durazno, Ciruelo	1,0 a 1,5 L/ha	Desde inicio de flor. 2 a 4 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Manzana, Membrillo, Pera		Desde inicio de flor. 2 a 3 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Palto		Durante floración, frutos de 10 a 20 mm. 3 a 4 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Mandarino, Naranja, Limonero, Clementino, Pomelo, Tangelo	1,0 L/ha	Desde prefloración hasta caída de pétalos. 2 a 3 aplicaciones. Cada 10 a 14 días.
Avellano	0,75 - 1,5 L/ha	Desde inicio de cuaja hasta frutos de 10 mm. Cada 14 a 21 días.
Nogal	1,0 - 1,5 L/ha	Desde inicio de flor pistilada hasta frutos recién cuajados. 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Olivos	1,0 - 1,5 L/ha	Desde inicio de cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Kiwi	1,0 L/ha	Brotes de 10 – 20 cm. 2 aplicaciones cada 14 días.
Uva de Mesa	1,0 L/ha	Brotes de 10 – 20 cm. 2 aplicaciones cada 14 días.
Pisquera, Vinífera	1,0 - 1,5 L/ha	Desde inicio de crecimiento de bayas. 2 a 3 aplicaciones. Cada 7 días.
Pistacho	1,0 - 1,5 L/ha	Desde fruto recién cuajado, hasta 20-30 días después de plena flor. 2 a 3 aplicaciones cada 14 a 21 días.
Arándano, Mora, Frambuesa, Cramberries, Zarzaparrilla	1,0 - 1,5 L/ha	Inicio de brotación, durante floración hasta cuaja. 2 a 6 aplicaciones. Cada 7 a 10 días.
Frutilla		
Avena, Trigo, Arroz, Cebada, Canola, Triticale	0,5 - 1,0 L/ha	Desde 2da y 5ta hoja. 1 a 2 aplicaciones.
Maíz, Maíz Dulce, Maíz Silo		1 a 2 aplicaciones desde espigamiento hasta floración.
Remolacha, Nabo forrajero		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Tomate industrial		Desde floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Papa, Zanahoria		Desde 6ta y 8va hoja y 30 días después.
Alfalfa, Ballica, Trébol, Césped		Realizar las aplicaciones después de cada corte cuando la planta tenga entre 10 y 15 cm de altura.
Arvejas, Habas, Porotos, Garbanzo, Lenteja, Lupino, Soya		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Ajo, Cebolla, Puerro		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Tomate, Berenjena, Ají, Pimiento		Desde floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Repollo, Brócoli, Coliflor		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Melón, Sandía, Zapallo		Desde floración hasta cuaja. 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días.
Espárrago, Apio, Alcachofa		1 a 2 aplicaciones desde 2 semanas post trasplante u emergencia.
Lechuga, Rúcula, Espinaca, Acelga		
Albahaca, Cilantro, Perejil, Orégano, Salvia		

Maxigrow Excel



**Optimiza el rendimiento,
floración y formación de frutos.**

Bioestimulante

Compatibilidad

Maxigrow Excel es compatible con la mayoría de los productos presentes en el mercado. Para su empleo con aguas duras y/o de pH alto o muy bajo, se recomienda regular la mezcla a valores cercanos a 7,0.